

Pest monitoring guide for Western Grapeleaf Skeletonizer *Harrisina metallica*

Look for this pest on the underside of grape, Boston ivy and Virginia creeper leaves.



Damage caused by 1st - 4th stage larvae



Early symptoms include 3 "cleared" areas



Eggs laid in mass on underside of leaf



Third stage larvae feed as a group



Fourth stage larvae feed side-by-side



Fifth stage larvae feed individually;
"skeletonized" leaf with main veins remaining

IF YOU SEE THIS PEST PLEASE NOTIFY:

Napa County Agricultural Commissioner
(707) 253-4357 or
agcommissioner@countyofnapa.org

UCCE-Napa County
(707) 253-4221 or cenapa@ucanr.edu

Prepared by L. Varela & M. Cooper (July 2015)
Photo credit: J. K. Clark



Male and female moths fly low during the day.

Guía de monitoreo para la plaga Gusano Presidiario de la Vid *Harrisina metallica*

Busque esta peste en el revés de hojas de uva, hiedra de Boston o “Virginia Creeper”



Daño causado por larvas del 1^{er} al 4^o estado.



Áreas translucidas son los primeros síntomas.



Huevos depositados en grupo en el revés de la hoja



Larvas del 3^{er} estado alimentándose en grupo.



Larvas del 4^o estado comiendo una al lado de otra.



Larvas del 5^o estado comen individualmente y deshuesan la hoja dejando sólo las venas.

SI VE ESTA PLAGA AVISE AL:

Comisionado de Agricultura, Condado de Napa
(707) 253-4357
agcommissioner@countyofnapa.org

UC Extensión Cooperativa, Condado de Napa
(707) 253-4221, cenapa@ucanr.edu

Preparado por L. Varela & M. Cooper (Julio 2015)
Fotos: J. K. Clark



Macho y hembra vuelan bajo durante el día.